

- Neonato con meningite, nei primi 5 giorni di terapia o fino alla stabilizzazione clinica. Neonato con sindrome emorragica o trombotica in fase acuta. Neonato sottoposto a dialisi peritoneale o ad emofiltrazione.

Caratteristiche dei neonati che necessitano di assistenza subintensiva:

- Neonato con età post-concezionale < 28 settimane o peso alla nascita < 1000 gr., dopo i primi dieci giorni di vita, fino al raggiungimento di un'età post-concezionale di 32 settimane, di un peso di 1500 gr. e di un apporto alimentare ottimale (75% di alimento per OS e assenza di necessità di NP).
- Neonato con RDS acuta o patologia polmonare cronica in ossigenoterapia e/o CPAP nasale, con $FiO_2 < 0.40$ o con $FiO_2 > 0.40$ per meno di 8 ore al giorno, dopo la settimana di vita. Neonato con accessi vascolari venosi centrali (catetere ombelicale, catetere venoso centrale), fino a 48 ore dopo l'inserzione.
- Neonato con patologia chirurgica maggiore, nel post-operatorio dopo le 72 ore, fino al termine della prima settimana.
- Neonato con pregressa NEC non chirurgica, fino all'alimentazione enterale totale.
- Neonato con patologia neurologica grave (convulsioni, sindrome postasfittica o post-emorragica), dopo stabilizzazione iniziale.
- Neonato con sepsi accertata, con o senza meningite, dalla stabilizzazione clinica fino al termine della terapia antibiotica.
- Neonato con sindrome emorragica o trombotica in trattamento di mantenimento e in condizioni cliniche stabili.
- Neonato sottoposto ad exsanguinotrasfusione fino a 24 ore dopo l'intervento.

1.1.7.1. Requisiti Strutturali

Il modulo minimo di una U.T.I.N. è di almeno:

- 4 posti letto di Terapia Intensiva;
- 4 posti letto di Terapia Subintensiva.

1.1.7.2. Requisiti tecnologici

la U.T.I.N. dispone impianto di condizionamento ambientale che assicuri:

- temperatura interna invernale ed estiva 20-28 °C;
- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;